



# Szybka ulga.

Skuteczne leczenie  
hemoroidów.<sup>1</sup>



Lek Procto-Glyvenol® może być stosowany  
od 4. miesiąca ciąży oraz podczas karmienia piersią<sup>2</sup>

DZIAŁA  
JUŻ PO



MINUTACH

Lek do miejscowego leczenia zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów.

**Procto-Glyvenol**

400 mg + 40 mg, czopki, Tribenozyd + Lidokainum  
15 czopków. Połacie doodbytnicy.



**Procto-Glyvenol**



Lek do miejscowego leczenia  
zewnętrznych i wewnętrznych  
hemoroidów.  
400 mg + 40 mg/g,  
krem doodbytnicy  
Tribenozyd +  
Lidokaina chlorowodorku.  
15 kremów 30 g  
RECORDATI

Produkt leczniczy (A) Procto-Glyvenol, (50 mg + 20 mg)/g, krem doodbytniczy. 1 g kremu doodbytniczego zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg lidokainy chlorowodorku. (B) Procto-Glyvenol, 400 mg + 40 mg, czopki. 1 czopek zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg lidokainy. Wskazanie: (A,B) Miejscowe leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów. Podmiot odpowiedzialny: (A,B) Recordati Ireland Ltd., Raheens East, Ringaskiddy, Co. Cork, Irlandia.

1. Lorenc Z. et al. Eur Rev Med Pharm Sci 2016; 20: 2742-2751. 2. Charakterystyka Produktu Leczniczego Procto-Glyvenol (50mg+20mg)/g, krem doodbytniczy, data zatwierdzenia 09/2022. Charakterystyka Produktu Leczniczego Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg, czopki, data zatwierdzenia 02/2022. PGL/2023-03/08

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

 RECORDATI